


Figura 1 - Gráfico de Kaplan-Meier das variáveis que influenciam significativamente o tempo de sobrevida segundo o teste Log-rank



Fonte: Os autores

Tabela 1 - Regressão de Cox Simples dos fatores com efeito significativo no risco de delirium

Características	n	HR¹	95% IC¹	Valor p
Transfusão Sanguínea	115			
Não		—	—	
Sim		2,84	1,25 - 6,45	0,013
Uso de Anti-inflamatório	116			
Sim		—	—	
Não		3,32	1,02 - 10,8	0,047
Uso de Sedativos	116			
Sim		—	—	
Não		2,12	1,05 - 4,25	0,035
Faixa Etária	116			
Adulto		—	—	
Idoso		2,28	1,14 - 4,57	0,020
Hipertensão	115			
Hipertenso medicado		—	—	
Hipertenso não medicado		2,62	1,05 - 6,55	0,039
Não hipertenso		0,95	0,47 - 1,92	0,9
Porte de Cirurgia	116			
Menor Porte - Até 240 min		—	—	
Maior Porte - 240 ou mais		2,52	1,30 - 4,89	0,006

¹HR = Taxa de risco, IC = Intervalo de confiança

Tabela 2 - Regressão de Cox Múltipla após etapas de modelagem

Características	Modelo Basal			Modelo Final		
	HR¹	95% IC¹	Valor p	HR¹	95% IC¹	Valor p
Transfusão						
Não	—	—		—	—	
Sim	2,22	0,96 - 5,14	0,062	2,41	1,03 - 5,61	0,042
Porte de Cirurgia						
Menor Porte - Até 240 min	—	—		—	—	
Maior Porte - 240 ou mais	2,24	1,14 - 4,41	0,019	2,27	1,15 - 4,47	0,018
Caráter de Cirurgia						
Eletiva				—	—	
Urgência				3,09	1,07 - 8,89	0,037

¹HR = Taxa de risco, IC = Intervalo de confiança