

Possui o hábito de coçar os olhos?	Pacientes	Porcentagem
Sim	1042	52,41%
Não	860	43,26%
Não respondido	86	4,33%
Qual foi sua última consulta oftalmológica?	Pacientes	
Até 1 ano	746	37,53%
2-5 anos	711	35,76%
Nunca fui	223	11,22%
5-10 anos	130	6,54%
Mais de 10 anos	101	5,08%
Não respondido	77	3,87%
Possui histórico familiar de DMRI?	Pacientes	
Não	1746	87,83%
Sim	155	7,80%
Não respondido	87	4,38%
Possui histórico familiar de glaucoma?	Pacientes	
Não	1496	75,25%
Sim	408	20,52%
Não respondido	84	4,23%
Já foi submetido a cirurgia de catarata?	Pacientes	
Não	1773	89,19%
Sim, os dois olhos	90	4,53%
Sim, olho direito	27	1,36%
Sim, olho esquerdo	13	0,65%
Não respondido	85	4,28%

Tabela 1 - Parte do questionário sobre a saúde ocular e histórico familiar de doenças oftalmológicas mais prevalentes.

Resultado do exame dos pacientes.		
Alteração no exame	1520	76,46%
Sem alterações	291	14,64%
Alteração no questionário	156	7,85%
Inconclusivo	21	1,06%
Quantidade de alterações no exame por paciente		
1 alteração	151	9,93%
2 alterações	663	43,62%
3 alterações	485	31,91%

4 alterações	221	14,54%
Quantidade de alterações no questionário por paciente		
1 alteração	93	59,62%
2 alterações	41	26,28%
3 alterações	18	11,54%
4 alterações	4	2,56%

Tabela 2 - Resultado do questionário e exame físico dos olhos, após avaliação do oftalmologista, apontando se há alteração e se é no questionário ou exame físico, bem como tabelas demonstrando dos pacientes alterados, a quantidade de alterações encontradas.

Variáveis Alteração no exame	Participantes	Porcentagem
Erros refracionais	1320	86,84%
Baixa de acuidade visual	1036	68,16%
Pressão intraocular elevada	312	20,53%
Alteração na topografia de córnea	261	17,17%
Diferença de pressão intraocular entre os olhos	204	13,42%
Córnea fina	132	8,68%
Alteração na imagem de retina	121	7,96%
Ângulo da câmara anterior estreito	120	7,89%
Lesão de conjuntiva	105	6,91%
Alteração na imagem do disco óptico	51	3,36%
Sinais de catarata	48	3,16%
Alteração da imagem da conjuntiva	25	1,64%
Câmara anterior rasa	24	1,58%
Lesão de pálpebra	20	1,32%
Alteração na Topografia de córnea	19	1,25%
Opacidade corneana	4	0,26%
Pupila irregular	4	0,26%
Lesão de íris	3	0,20%
Córnea espessa	2	0,13%
Sinais de Catarata	2	0,13%
Lesão pigmentada na conjuntiva	1	0,07%

Tabela 3 - Resultado da avaliação das alterações do exame, com todas as variáveis analisadas, quantos pacientes apresentaram esse erro e a porcentagem do total de alterações.

Variáveis alteração no questionário	Participantes	Porcentagem
Nunca foi ao oftalmologista	59	37,82%
Histórico familiar de glaucoma	43	27,56%
Hipertensão arterial sistêmica	27	17,31%
Última consulta há mais de 2 anos	20	12,82%
Última consulta há mais de 10 anos	17	10,90%
Histórico familiar de DMRI	14	8,97%
Diabetes	13	8,33%
Última consulta há mais de 5 anos	13	8,33%
Histórico familiar de ceratocone	8	5,13%
Obesidade	6	3,85%
Olho seco	5	3,21%
Alergia ocular	4	2,56%
Artrite	4	2,56%
Tabagismo	3	1,92%
Olho Seco	2	1,28%
Histórico familiar de Ceratocone	2	1,28%
Estrabismo	1	0,64%
Glaucoma	1	0,64%
Conjuntivite	1	0,64%
Última consulta entre 2 e 5 anos	1	0,64%
Blefarite	1	0,64%

Tabela 4 - Resultado da avaliação do questionário, com todas as variáveis analisadas, quantos pacientes apresentaram esse erro e a porcentagem do total de alterações.