


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI

Diretoria de Pesquisa - DPq

Para a etapa de revisão de escopo: a partir da análise dos 1.047 estudos identificados, apenas 14 versavam sobre a temática e corresponderam à amostra final. A seleção dos estudos foi apresentada no fluxograma (Figura 1)

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDOS NAS BASES DE DADOS





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI
Diretoria de Pesquisa - DPq

INCLUÍDOS




Figura 1: Fluxograma da revisão de escopo

Fonte: PRISMA, 2025.

Após essa etapa, elaborou-se quadros de: 1) discriminando os seguintes pontos de cada artigo: título, autores, periódico, tipo de estudo, país de origem e ano de publicação **identificação dos artigos, objetivos dos mesmo**; 2) Relação de estudos selecionados com identificação de público-alvo, objetivo do estudo, fatores de risco, diagnósticos de enfermagem, e resultados das ações de enfermagem e 3) Relação dos artigos selecionados referentes aos mesmos fatores de risco, diagnóstico de enfermagem. Para efeito de relatório, por motivo de limitação de páginas, apresentamos aqui apenas o quadro 3, que relaciona-se ao tema e o desfecho desejado

Relação dos artigos selecionados referentes aos mesmos fatores de risco, diagnóstico de enfermagem. Autor, 2024.

FATORES DE RISCO IDENTIFICADO	DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM	QUANTIDADE DE ARTIGOS QUE DESCREVERAM O FATOR/DIAGNÓSTICO	%
Ansiedade	Ansiedade: “é a uma resposta emocional a uma ameaça difusa na qual o indivíduo antecipa um	06	21,42%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI

Diretoria de Pesquisa - DPq

	perigo, catástrofe ou infortúnio iminente e não específico.”		
Medo do desconhecido	Medo: “uma resposta emocional básica e intensa provocada pela identificação da ameaça iminente, envolvendo uma reação de alarme imediata.”	03	10,71%
Estresse e Transtorno de Adaptação	Síndrome do estresse por mudança: “Distúrbio fisiológico e/ou psicossocial decorrente de transferência de um ambiente para outro.”	01	3,57%
Ansiedade e Incerteza Pré-operatória	Conflito de Decisão: “Incerteza sobre o curso de ação a ser tomada quando da escolha entre concorrentes. As ações envolvem risco, perda ou desafio a valores e crenças.”	01	3,57%
Mucosa na laringe	Risco de sufocação: “susceptibilidade a disponibilidade inadequada de ar para inalação, que pode comprometer a saúde.”	01	3,57%
Diagnósticos de Enfermagem	Sobrecarga de Estresse: “quantidades excessivas e tipos	01	3,57%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI

Diretoria de Pesquisa - DPq

emocionais com mais frequência na visita pré-operatória em pacientes que se submeteram a cirurgia oncológica	de demandas que requerem ação.”		
Diagnósticos de Enfermagem emocionais com mais frequência na visita pré-operatória em pacientes que se submeteram a cirurgia oncológica	Temer: “Resposta emocional básica e intensa despertada pela detecção de iminentes ameaças, envolvendo uma reação de alarme imediata.”	01	3,57%
Diagnósticos de Enfermagem emocionais com mais frequência na visita pré-operatória em pacientes que se submeteram a cirurgia oncológica	Risco de Resiliência Prejudicada: “suscetível à diminuição da capacidade de recuperação de mudanças adversas percebidas por situações de gestão, por meio de um processo dinâmico de adaptação, que pode comprometer a saúde.”	01	3,57%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI

Diretoria de Pesquisa - DPq

Dor crônica	Dor Crônica: “Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International Association for the Study of Pain); início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, constante ou recorrente, sem término antecipado ou previsível e com duração maior que 3 meses.”	01	3,57%
Respiração no pós-operatório de otorrino	Troca de gases prejudicada: “Excesso ou déficit na oxigenação e/ou na eliminação de dióxido de carbono.”	01	3,57%
Nutricional no pós-operatório de otorrino	Deglutição Prejudicada: “funcionamento anormal do mecanismo da deglutição associado a déficits na estrutura ou função oral, faríngea ou esofágica.”	01	3,57%
Falta de conhecimento sobre a patologia,	Conhecimento deficiente: “ausência de informações cognitivas ou de aquisição de	07	25%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI

Diretoria de Pesquisa - DPq

procedimento cirúrgico e anestésico.	informações relativas a um tópico específico.”		
Qualidade do sono	Distúrbio no padrão de sono: “Despertares com tempo limitado em razão de fatores externos.”	01	3,57%
Necessidades biopsicossociais	Interação social prejudicada: “É a quantidade insuficiente ou excessiva, ou qualidade ineficaz de troca social.”	01	3,57%
Processo de habilidade sobre autocuidado de higiene, imobilização da incisão cirúrgica, curativos da ferida operatória, exercícios físicos, exercícios respiratórios relacionados ao pós-operatório.	Disposição para autocuidado melhorado: “padrão de realização de atividades para si mesmo para atingir as metas relativas à saúde, de que pode ser fortalecido.”	01	3,57%

Fonte: Autoras, 2025.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI

Diretoria de Pesquisa - DPq

Tal revisão foi fundamental para o desenvolvimento do roteiro, que está atualmente em fase final de elaboração e possui na sua versão preliminar 52 itens divididos em 05 dimensões: 1- Identificação do paciente, 2- Ciência e autorização do procedimento cirúrgico, 3- Necessidades fisiológicas, 4- Necessidades de segurança e 5- Acuidade sensorial